

NOTA BREVE

Algunas citas florísticas gallegas

J. FAGÚNDEZ

Departamento de Botánica. Facultade de Farmacia
Universidade de Santiago de Compostela
E-15706 Santiago de Compostela. jaimefa@usc.es

(Recibido, abril de 2004. Aceptado, junio de 2004)

Se comentan varias citas corológicas originales de siete especies de la flora vascular gallega, recogidas en diferentes lugares de la geografía de Galicia. De estas especies, cinco son novedades provinciales y una es novedad para Galicia: *Cuscuta planiflora* Ten.

Amaranthus blitum L. subsp. *blitum*

ESP, *A CORUÑA: Vedra, 29TNH43, 180 m s.n.m. Cultivo y márgenes de cultivo. J. Fagúndez & M. Barrada. 10-V-2000. SANT 50108.

Durante la realización del inventario florístico del área de estudio de una tesis sobre control de plagas (BARRADA, 2003) se herborizó esta especie, frecuente en los cultivos de la zona, ya citada para Ourense, Lugo y Pontevedra (CARRETERO, 1990). La subespecie *emarginatus* (Moq. ex Uline & Bray) Carretero, Muñoz Garm. & Pedrol ha sido citada recientemente como novedad para Galicia (VALDÉS BERMEJO *et al.*, 1995).

Cuscuta planiflora Ten.

ESP, *LUGO: Seoane do Caurel, Altos de Visuña, 29TPH52, 1400 m s.n.m. En pastizal calizo sobre *Sideritis hyssopifolia* subsp. *caureliana*. J. Fagúndez & A.R. Larrinaga. 16-VII-2003. SANT 50110. LEÓN: Ponferrada, Apóstoles, La Guiana, 29TPH90, 1350 m s.n.m. En

pastizal sobre derrubios calizos, sobre *Teucrium capitatum* y otras especies. J. Fagúndez, A.R. Larrinaga & J.L. Garrido. 15-VII-2003. SANT 50113.

Esta especie presenta las piezas del cáliz engrosadas y turgentes, de sección casi circular (GARCÍA, 2002). No existen citas previas gallegas, aunque hay un pliego en el herbario SANT (Amigo *et al.* 1997; SANT 39092) de Corrubedo (A Coruña) determinado como *C. planiflora*. No nos pronunciamos sobre esta determinación ya que el carácter diferenciador principal no es claro una vez prensada.

Narcissus cyclamineus DC.

ESP, LUGO: Guntín, río Ferreira, 29TPH04, 464 m s.n.m. Aliseda riparia. J. Fagúndez 10-III-2003. SANT 50109.

Especie considerada como con "datos deficientes" por la lista roja de la flora vascular española (VV.AA., 2000). La cita del río Landro, en Viveiro, comunicada por Casaseca a LAÍNZ (1966) es la única cita anterior de Lugo. A pesar de una intensa prospección no hemos encontrado la especie en Viveiro, pero sí en esta otra localidad luguesa de la vertiente del Miño. También se ha citado en Ourense (RODRÍGUEZ GRACIA, 1989; PULGAR *et al.*, 2002) aunque sus poblacio-

nes principales se encuentran en las provincias de A Coruña y Pontevedra desde el Mandeo hasta el Miño, y el noroeste de Portugal, desde el nivel del mar hasta casi los 1000 m s.n.m. (MORENO SAIZ y SAINZ OLLERO, 1992; FDEZ. CASAS, 1996).

Orobanche hederæ Duby

ESP, *OURENSE: Rubiá, Covas, El Estrecho, 29TPH70, 350 m s.n.m. Sobre calizas, parasitando a *Hedera*. J. Fagúndez, A. R. Larrinaga & P. Guitián. 10-VI-2003. SANT 50111.

La primera cita gallega de esta especie es de MERINO (1906) de Diomondi (Lugo). Recientemente se ha citado de Cedeira como novedad para A Coruña y de Foz, norte de la provincia de Lugo (SILVA PANDO *et al.*, 2000). Esta cita es novedad para Ourense y deja clara la dispersión geográfica de la especie en Galicia.

Parapholis incurva (L.) C.E. Hubbard

ESP, *LUGO: Ribadeo, Rinlo, praia de Esteiro, 29TPJ52, 5 m s.n.m. Suelo esquelético, arcilloso en repisas de pizarra salpicados por la maresía. J. Fagúndez 26-VI-2003. SANT 49965.

Citada recientemente como novedad para la provincia de A Coruña (SILVA PANDO *et al.*, 2000) de Boiro, ya conocida de Pontevedra (MERINO, 1909 y otros). Esta especie está también presente en la costa de Asturias (DÍAZ GONZÁLEZ *et al.*, 1994). Es novedad provincial.

Prunella x intermedia Link (*P. vulgaris* x *P. laciniata*)

ESP, *OURENSE: Rubiá, Oulego, Portela, parque natural Enciña da Lastra, 29TPH70, 540 m s.n.m. Prado sobre calizas. J. Fagúndez, A. R. Larrinaga, P. Guitián & J. Guitián. 13-VI-2003. SANT 50107.

Las únicas citas gallegas de este híbrido parecen ser las de MERINO (1909) de Ancares y Caurel. SILVA PANDO (1994) la cita de nuevo en Ancares, aunque no presenta ningún pliego del herbario LOU, ya sea de Merino o posterior. Este híbrido es frecuente en las zonas en las que conviven los parentales (SMITH, 1972). Se diferencia claramente de *P. laciniata*, también loca-

lizada en la zona (J. Fagúndez SANT 50106) por tener la corola purpúrea y de *P. vulgaris* por ser muy pelosa y con hojas superiores no enteras, lobadas, hastadas o laciniadas. Otro nombre utilizado para este híbrido es *Prunella x hybrida* Knaff.

Viola odorata L.

ESP, *PONTEVEDRA: Cuntis, Mesego, Zo, 29TNH3921, 420 m s.n.m. Talud umbrío sobre la carretera, próximo a unas casas. J. Fagúndez 21-II-2004. SANT 50308.

Al igual que señala LAÍNZ (1991) para otras localidades gallegas, no creemos que sea autóctona aunque al parecer se naturaliza con facilidad. Es novedad provincial.

AGRADECIMIENTOS

La prospección de *Narcissus cyclamineus* se realizó durante un proyecto de la Universidade de Santiago de Compostela, subvencionado por la Fundación Ramón Areces. Agradezco su ayuda a A. R. Larrinaga y P. Guitián, compañeros en el proyecto y J. Guitián, director del mismo. Gracias al trabajo de M. Barrada citamos *Amaranthus blitum*. Agradecemos también a J. Amigo e I. Pulgar sus comentarios sobre este trabajo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BARRADA, M. (2003). *Desarrollo de un modelo de predicción de actividad de la babosa Deroceras reticulatum (Müller, 1774) aplicable al control de plagas en zonas agrícolas de Galicia*. Tesis doctoral (inéd.), Universidade de Santiago de Compostela.
- CARRETERO, J.L. (1990). *Amaranthus* L. In: Castroviejo, S. *et al.* (Eds.). *Flora Iberica vol. II*. C.S.I.C., R.J.B. Madrid.
- DÍAZ GONZÁLEZ, T.E., FERNÁNDEZ PRIETO, J.A., NAVA FERNÁNDEZ, H.S. & FERNÁNDEZ CASADO, M^aA. (1994). Catálogo de la flora vascular de Asturias. *Itinera Geobotánica*, 8: 529-600.

- FERNÁNDEZ CASAS, J. (1996). Asientos corológicos 750. *Narcissus cyclamineus* DC. *Fontqueria*, **44**: 219-221.
- GARCÍA, M.A. (2002). *Cuscuta* L. In: López Sáez, J.A., Catalán, P. & Sáez, Ll. (Eds.). *Plantas parásitas de la Península Ibérica e Islas Baleares*. Mundi-Prensa, Madrid.
- LAÍN, M. (1966). Aportaciones al conocimiento de la flora gallega, IV. *Anales I.F.I.E.*, **10**: 298-332.
- LAÍN, M. (1991). De re chorologica, nova et vetera. V. *Anales del Jardín Botánico de Madrid*, **49**(1): 148-150.
- MERINO, B. (1906). *Flora descriptiva e ilustrada de Galicia vol.II*. Tipografía Galaica, Santiago de Compostela.
- MERINO, B. (1909). *Flora descriptiva e ilustrada de Galicia vol.III*. Tipografía Galaica, Santiago de Compostela.
- MORENO SAIZ, J.C. & SAINZ OLLERO, H. (1992). *Atlas corológico de las monocotiledóneas endémicas de la Península Ibérica e Islas Baleares*. ICONA, Ministerio de Agricultura, Madrid.
- PULGAR, I., MANSO, D. & VELLO, C. (2002). Flora vascular de la Baixa Limia (SO Ourense, España), II. Aportaciones. *Studia botanica*, **21**: 13-26.
- RODRÍGUEZ GRACIA, V. (1989). Comentarios a la flora de Galicia IV. *Boletín auriense*, **18-19**: 371-377.
- SILVA PANDO, F.J. (1994). Flora y series de vegetación de la Sierra de Ancares. *Fontqueria*, **40**: 233-388.
- SILVA PANDO, F.J., GÓMEZ VIGIDE, F., GARCÍA MARTÍNEZ, X.R. & BLANCO DIOS, J.B. (2000). Aportacións á flora de Galicia, VI. *Nova Acta Científica Compostelana (Biología)*, **10**: 21-33.
- SMITH, A.R. (1972). *Prunella* L. In: Tutin, T.G. et al. (Eds.). *Flora Europea vol. III*. Cambridge University Press, U.K.
- VALDÉS BERMEJO, E., SILVA PANDO, F.J., RODRÍGUEZ GRACIA, V., GÓMEZ VIGIDE, F. & GARCÍA MARTÍNEZ, X.R. (1995). Aportaciónes a la flora de Galicia, V. *Nova Acta Científica Compostelana (Biología)*, **5**: 135-152.
- VV.AA. (2000). Lista Roja de la Flora Vascular Española (valoración según categorías UICN). *Conservación Vegetal*, **6**(extra): 11-38.